

Справка


Дана (ФИО) _____, _____ лет
находился с _____ 20__ г., по _____ 20__ г.

Проведена операция Санация полости рта под общим обезболиванием.

Рекомендации:

1. Контрольные осмотры и профилактическое фторирование зубов (покрытие раствором серебра) по месту жительства врачом стоматологом детским через 1 мес., затем через 3 мес., в течение года. Далее на усмотрение стоматолога детского по м/жительства.
3. Натрия фторид по 1/ тб. (1,1мг.)х 1 раз в день, перед сном рассасывать с 1 сентября по 1 июня, лето перерыв
4. Препараты кальция (Киндербиовиталь гель, Кальцинова, Компливит кальций D3).
5. Гигиена полости рта:
 - а) З/паста по возрасту R.O.C.S., Splat, Silka, Bioripair, Curaprox zero;
 - б) R.O.C.S. гель, GT Tooth Mousse (при отсутствии аллергии на козеин), пенка Splat - 2 раза в день наносить на зубы, не смывать в течение часа.
6. Для нормализации иммунитета полости рта:
 - а) Ротовые ванночки настоем мать-и-мачехи * 2 раза в день (1 ст.л. травы х 1 стакан кипятка, настоять 10-15 мин.), в течение 10-14 дней.
 - б) Таблетки Лизобакт по 1 таб.х 2 раза в день, 10 дней (рассасывать).
 - в) Фагодент *2 раза в день, 7-10 дней.
7. При удалении зубов:
 - а) Антисептические полоскания после приема пищи растворами (фурацилин) или отварами (ромашка, шалфей).
 - б) Аскорутин по 1 таб* 3 раза в день, 10 – 14 дней.
8. Консультация врача – ортодонта по месту жительства.
9. Диета: исключить ночное кормление сахаросодержащими жидкостями (компот, чай, кефир).
9. Во избежание сколов пломбы и прилегающих к пломбе твердых тканей зуба не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например: орехи, сухари), откусывать от больших кусков (например: от цельного яблока).
10. Не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например: чернику, чай, кофе и т. п.), в течение первых двух суток после пломбирования зуба.

Врач _____



Паспорт санаций

ФИО ребенка _____

Возраст _____

Диагноз _____

Формула

7	6	V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V	6	7

Дата санаций _____

Вид обезболевания _____

Протокол санаций

Поверхностный кариес _____

Средний кариес _____

Пульпит _____

Периодонтит _____

Профилактика _____

После проведения санации под общим обезболиванием за пациентом устанавливается диспансерное наблюдение врачом-стоматологом по месту жительства в течение 12 месяцев. (Приложение к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 29 сентября 2017 г. №1654-п).